



NATURA 2000, Gebietsrecherche online

Gebietsdaten NATURA 2000

| | |
|--------------------------------|---|
| Gebiets-Nr. | 5835-371 |
| Gebietsname | Feuchtgebiet mit Vermoorungen südlich Hohenberg |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 58,7 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturreaum | (D48) - Thüringisch-Fränkisches Mittelgebirge |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Wiesen-Moor-Komplex, insbesondere hochwertige Borstgrasrasen und Gewässer. Eines der wenigen Vorkommen von Zwischenmoor-Lebensraumtypen im Frankenwald. |

[Liste der Managementpläne](#)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Bezeichnung | prioritär |
|------|---|-----------|
| 3130 | Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea | |
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6520 | Berg-Mähwiesen | |
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
| 91E0 | Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |

Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie

| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|-------------------------|----------------|-----------|
| <i>Cottus gobio</i> | Groppe | |

Landkreise

| Landkreis | Flächenanteil in % |
|-----------|--------------------|
|-----------|--------------------|

Betroffene TK 25

| Nummer | Haupt-TK | |
|--------|----------|--|
| 5835 | ja | |
| 5836 | | |

Stand: 2016

Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (<http://www.lfu.bayern.de/impressum>)