



NATURA 2000, Gebietsrecherche online

Gebietsdaten NATURA 2000

| | |
|--------------------------------|--|
| Gebiets-Nr. | 6025-371 |
| Gebietsname | Gramschatzer Wald |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 4.236,2 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D56) - Mainfränkische Platten |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Einer der größten Waldkomplexe der süddeutschen Muschelkalkregion, Schwerpunktgebiet der Bechsteinfledermaus |

[Liste der Managementpläne](#)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Bezeichnung | prioritär |
|------|---|-----------|
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>) | |
| 7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>) | |
| 9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (<i>Cephalanthero-Fagion</i>) | |
| 9160 | Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (<i>Carpinion betuli</i>) [<i>Stellario-Carpinetum</i>] | |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald <i>Galio-Carpinetum</i> | |

Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie

| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| <i>Barbastella barbastellus</i> | Mopsfledermaus | |
| <i>Glaucopsyche nausithous</i> | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| <i>Myotis bechsteinii</i> | Bechsteinfledermaus | |
| <i>Myotis myotis</i> | Großes Mausohr | |

Landkreise

| Landkreis | Flächenanteil in % |
|-----------|--------------------|
| | |

Betroffene TK 25

| Nummer | Haupt-TK | |
|--------|----------|--|
| 6025 | ja | |
| 6026 | | |
| 6125 | | |
| 6126 | | |

Stand: 2016

Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (<http://www.lfu.bayern.de/impressum>)