



NATURA 2000, Gebietsrecherche online

Gebietsdaten NATURA 2000

| | |
|--------------------------------|--|
| Gebiets-Nr. | 8229-301 |
| Gebietsname | Elbsee |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 149,6 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturreaum | (D66) - Südliches Alpenvorland |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Bestes Beispiel einer nährstoffreichen bis nährstoffarmen Verlandungsserie in Schwaben, mehrere Eiszeitreliktarten in isolierten Vorkommen |

[Liste der Managementpläne](#)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Bezeichnung | prioritär |
|------|--|-----------|
| 3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 7120 | Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore | |
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 91D0 | Moorwälder | ja |

Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie

| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | |
| Glaucopsyche nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Lycaena helle | Blauschillernder Feuerfalter | |
| Vertigo angustior | Schmale Windelschnecke | |
| Vertigo geyeri | Vierzähmige Windelschnecke | |

Landkreise

| Landkreis | Flächenanteil in % |
|-----------|--------------------|
| | |

Betroffene TK 25

| Nummer | Haupt-TK | |
|--------|----------|--|
| 8229 | ja | |
| 8129 | | |

Stand: 2016

Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (<http://www.lfu.bayern.de/impressum>)