



## NATURA 2000, Gebietsrecherche online

### Gebietsdaten NATURA 2000

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Gebiets-Nr.</b>             | <b>8234-371</b>  |
| <b>Gebietsname</b>             | <b>Moore um Penzberg</b>   |
| Gebietstyp                     | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI)  |
| Größe (ha)                     | 1.157,5  |
| Biogeografische Region         | (K) - kontinental (mitteleuropäisch)   |
| Hauptnaturreaum                | (D66) - Südliches Alpenvorland   |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Bundesweit bedeutsame Moorachse, hydrologisch weitgehend intakte Hoch- und Übergangsmoore mit typischem Spektrum von Tier- und Pflanzenarten und besonderer Bedeutung für den Populationsverbund des Skabiosen-Schneckenfalters. |

[Liste der Managementpläne](#)

### Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Bezeichnung   | prioritär |
|------|---|-----------|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion |           |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)              |           |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe   |           |
| 7110 | Lebende Hochmoore   | ja        |
| 7120 | Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore   |           |
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore  |           |
| 7150 | Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)   |           |
| 7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion)  | ja        |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore  |           |
| 91D0 | Moorwälder  | ja        |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)             | ja        |

**Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie**

| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name                      | prioritär |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Bombina variegata       | Gelbbauchunke, Bergunke             |           |
| Cottus gobio            | Groppe                              |           |
| Cypripedium calceolus   | Frauenschuh                         |           |
| Euphydryas aurinia      | Goldener Scheckenfalter             |           |
| Glaucopsyche nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling |           |
| Glaucopsyche teleius    | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling  |           |
| Leucorrhinia pectoralis | Große Moosjungfer                   |           |
| Liparis loeselii        | Sumpf-Glanzkraut                    |           |
| Vertigo angustior       | Schmale Windelschnecke              |           |

**Landkreise**

| Landkreis | Flächenanteil in % |  |
|-----------|--------------------|--|
|           |                    |  |

**Betroffene TK 25**

| Nummer | Haupt-TK |  |
|--------|----------|--|
| 8234   | ja       |  |
| 8134   |          |  |
| 8233   |          |  |

Stand: 2016

Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (<http://www.lfu.bayern.de/impressum>)